



U kent het probleem van gewichtstoename maar al te goed?

Dan hebben wij daarvoor een mogelijke oplossing.

MiniMizer Maagring



Bij welke ingrepen kan de MiniMizer Ring worden gebruikt?

- 1 Bij de Gastric Sleeve/maagverkleining
- 2 Bij de Gastric Bypass
- 3 Bij de Omega loop/Mini-Bypass

De MiniMizer Ring kan zowel bij de primaire operatie als bij hersteloperaties worden gebruikt.

Is het moeilijk om de MiniMizer Ring tijdens een operatie te plaatsen?

Nee, iedere ervaren laparoscopische chirurg kan dit zonder problemen binnen enkele minuten doen.



Besprek gerust met uw chirurg of de MiniMizer Ring ook voor u de juiste keuze is.

Hoofdoorzaak van gewichtstoename

Veel obese patiënten kennen het probleem van de ongewenste gewichtstoename maar al te goed. Niet alleen diegenen die geen operatie hebben gehad, maar ook diegenen die al wel geopereerd zijn, kennen helaas het fenomeen van de ongewenste gewichtstoename na een periode van afvallen.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het sleutelwoord in deze vrijwel altijd de **verwijding (dilatatie)** van de restmaag en de maag-darmverbinding (de anastomose) is.



Hoe komt het tot deze dilatatie?

Om kort te gaan komt dit doordat de patiënten te veel eten, of te snel eten.

Door op deze manier te eten rekken de restmaag en de anastomose uit waardoor de initiële restrictie van deze structuren wegvalt en de passage van het eten almaar sneller en makkelijker plaatsvindt.

Dit is het begin van een vicieuze cirkel met de onvermijdelijke gewichtstoename tot gevolg. Wat ooit zo veelbelovend begon heeft zich weer omgedraaid, om gek van te worden...

Dit komt regelmatig voor bij patiënten die een gastric bypass of een gastric sleeve hebben ondergaan.

Wat kan een chirurg doen tegen de dilatatie van de restmaag en / of anastomose?

Men kan een maagring, zoals de MiniMizer Ring operatief implanteren. Dat helpt de dilatatie van de restmaag en de anastomose te voorkomen.



Banded Bypass met Ring



Banded Sleeve met Ring

De MiniMizer Ring

Waarvan is een MiniMizer Ring gemaakt?

De MiniMizer Ring is gemaakt van medisch siliconen en is een gecertificeerd chirurgisch implantaat. Dit materiaal is bio-inert, wat betekent dat het lichaam niet reageert op de aanwezigheid van het materiaal.

Functioneert de MiniMizer Ring als een aanpasbare maagband?


Nee, de MiniMizer Ring heeft geen reservoir en hoeft niet na de operatie met vloeistof nagevuld te worden.

Kan ik met de MiniMizer Ring net zoveel eten als zonder MiniMizer Ring?


Wanneer er een maagring om de restmaag zit en men eet te snel en /of te veel, krijgt men een overvol gevoel, waardoor men stopt met eten. De maagring helpt de patiënten dus om hun eetgewoontes te veranderen.



MiniMIZER
RING



Klinische resultaten met de maagring



%EWL tot 12 jaar

William Awad & Alvaro Garay & Cristián Martínez
OBES SURG (2012) 22:271–278

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat men tot **35% meer Excess Weight Loss (EWL)** kan bereiken indien een maagring om de restmaag wordt aangebracht bij de gastric bypass.

- met Ring
- zonder Ring